

せつしょく

えんげ

「あなたはよくむせませんか?」



笠岡純
言語聴覚士
食・嚥下障害の一つです【図】

○夜間、咳き込むことがある

○食事中によくむせる
（特に水分）
○食事中ではなくても笑
然むせる咳き込む（唾
液でむせる）

○飲み込んだ後も、口の
中に食物が残っている
○飯より麺類を好む
（下咽嚥）

○喝水より水を飲む
（T・看護師・放射線技師
が立ち会い、バリウムを混
ぜた液体（水など）・半固
形物（ゼリーなど）・固体
の量はどのくらいが
適当なのか。食べ物の形
態は刻んだものが良いの
か、それともミキサーにか
けたものの方が良いのか
など）

定期的に検査を受けていた
だくことで、現状を把握
し、少しでも誤嚥などの
危険を低下させることが
期待されます。

前回、鈴木医師より誤
嚥性肺炎（えんせいはい
えん）について説明があり
ましたが、今回はその原
因となる誤食・嚥下障害

（せうしょく・えんげ・しょ
う）が疑われる場合の流
れについて説明いたします。

特に高齢者の場合、家
族や介護者はこれらの症
状を見逃さないように注
意しましょう。

摂食・嚥下障害が疑わ
れる場合は、まず医師に
ご相談ください。医師の
指示によりVF検査（嚥

下反射）などで、飲
み込みの過程や状態を評
価します。

○喝水より水を飲む
（T・看護師・放射線技師
が立ち会い、バリウムを混
ぜた液体（水など）・半固
形物（ゼリーなど）・固体
の量はどのくらいが
適当なのか。食べ物の形
態は刻んだものが良いの
か、それともミキサーにか
けたものの方が良いのか
など）

定期的に検査を受けていた
だくことで、現状を把握
し、少しでも誤嚥などの
危険を低下させることが
期待されます。

誤嚥（飲食
物や唾液など
が誤って気管に
入ってしまうこ
と）もこの摂

○水分を取りたがらない
○発熱を繰り返す（誤嚥
性肺炎の疑い）
○夜間、咳き込むことが
ある


○食事中によくむせる
（特に水分）
○食事中ではなくても笑
然むせる咳き込む（唾
液でむせる）

○飲み込んだ後も、口の
中に食物が残っている
○飯より麺類を好む
（下咽嚥）

○喝水より水を飲む
（T・看護師・放射線技師
が立ち会い、バリウムを混
ぜた液体（水など）・半固
形物（ゼリーなど）・固体
の量はどのくらいが
適当なのか。食べ物の形
態は刻んだものが良いの
か、それともミキサーにか
けたものの方が良いのか
など）

○喝水より水を飲む
（T・看護師・放射線技師
が立ち会い、バリウムを混
ぜた液体（水など）・半固
形物（ゼリーなど）・固体
の量はどのくらいが
適当なのか。食べ物の形
態は刻んだものが良いの
か、それともミキサーにか
けたものの方が良いのか
など）

定期的に検査を受けていた
だくことで、現状を把握
し、少しでも誤嚥などの
危険を低下させることが
期待されます。



【図①】VF検査



【写真①】VF検査で得られる画像

